

Glycopyrroniumbromide 1 mg Tablet

Wat zit er in dit medicijn?

Glycopyrroniumbromide 1 mg Tablet bevat per tablet 1mg glycopyrroniumr als werkzaam bestanddeel. Verder bevat de tabletten lactose, povidon en magnesiumstearaat.

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Glycopyrronium vermindert de hoeveelheid speeksel. Het remt de werking van een lichaamseigen stof ('acetylcholine'). Acetylcholine beïnvloedt verschillende organen in het lichaam, zoals blaas, darmen, longen, de iris in het oog en de speekselklieren. Artsen schrijven het voor bij overmatige speekselvloed (kwijlen) bij kinderen met hersenletsel en bij volwassenen met de ziekte van Parkinson.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn het volgende.

Regelmatig

- Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping en opkomend maagzuur. Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Soms schrijven artsen bij dit medicijn een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping. Zelden ontstaat een verlamming van de darm. Als u enkele dagen geen ontlasting heeft gehad, waarschuw dan een arts. Raadpleeg ook uw arts, als u last krijgt van zuurbranden, oprispingen of pijn achter het borstbeen, vooral na de maaltijd of bij bukken of liggen.
- Droge mond en droge ogen. Als de mond te droog wordt, kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een te droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt. Mensen met de ziekte van Sjögren kunnen eerder last hebben van deze bijwerking. Raadpleeg uw arts, als u last krijgt van een te droge mond of oogirritatie.

Soms

- Blozen, duizeligheid en wazig zien.
- Rode, warme, droge huid en niet kunnen zweten. Hierdoor kunt u oververhit raken bij koorts of als het in de omgeving erg warm is.
- Verstopte neus.

Zelden

- Sufheid, concentratiestoornissen, rusteloosheid en stemmingswisselingen.
- Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

Glycopyrroniumbromide 1 mg Tablet

Zeer zelden

- Hartkloppingen. Als u hier last van krijgt, waarschuw dan uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van bovengenoemde bijwerking, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

- Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Neem glycopyrronium bromide 1 mg tabletten met vloeistof, bijvoorbeeld water, in.

Wanneer?

- Neem de voorgeschreven hoeveelheid in op een lege maag, dan wordt het medicijn het best opgenomen.
- De aanbevolen dosering is:
Volwassenen: 3 keer per dag 1 tablet van 1 mg.

Hoe lang?

Als dit medicijn binnen een aantal weken geen effect heeft, heeft verder gebruik geen zin. Als het medicijn wel effect heeft, kunt u dit medicijn gebruiken zo lang u het nodig heeft. Wanneer dit geneesmiddel niet helpt of wanneer de klachten zich herhalen, vraag dan advies aan uw arts.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u dit medicijn **3 keer per dag** gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Wat moet ik doen als ik te veel heb gebruikt?

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

Autorijden?

Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen. Rijd echter niet als u zich suf voelt.

Glycopyrroniumbromide 1 mg Tablet

Alcohol drinken?

Alcohol kan de duizeligheid en blozen in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

Alles eten?

Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit medicijn niet gebruiken

- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op glycopyrroniumbromide.
- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op een van de andere stoffen in de tablet.

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Zwangerschap en borstvoeding' en 'Bijwerkingen'.

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Dit medicijn kan schadelijk zijn voor de baby.

- Wilt u zwanger worden en krijgt u dit medicijn voor het eerst? Overleg dan met uw arts voordat u met dit medicijn begint. Misschien kan de arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn dat wel veilig is tijdens de zwangerschap.
- Gebruikt u dit medicijn al en wilt u zwanger worden? Overleg dan ook eerst met uw arts voordat u zwanger wordt. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn.
- Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger geworden? Overleg dan meteen met uw arts. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u is als u met het medicijn stopt.

Borstvoeding

Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk komt, kan het schadelijk zijn voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Glycopyrroniumbromide 1 mg Tablet

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

- Bepaalde medicijnen tegen depressie of psychosen. Deze medicijnen kunnen de bijwerkingen van glycopyrronium versterken. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
- Amantadine, een medicijn bij de ziekte van Parkinson of bij infectie met het influenza-virus. Deze combinatie kan meer bijwerkingen veroorzaken, met name duizeligheid, slaperigheid, opwinding en verwardheid. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
- Glycopyrronium kan de werking van onderstaande medicijnen verminderen.
 - Medicijnen bij de spierziekte myasthenia gravis (neostigmine, pyridostigmine, distigmine).
 - Pilocarpine, een medicijn tegen verhoogde druk in het oog en tegen een droge mond.
 - Medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer, zoals rivastigmine.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Hoe moet ik het medicijn bewaren?

Bewaar de tabletten beneden 25°C, niet in de koelkast of vriezer. Sluit de pot na gebruik goed af. Dit voorkomt bederf. Onaangebroken zijn de tabletten houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat. Na aanbreken van de verpakking zijn de tabletten maximaal 12 maanden houdbaar beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer, maar niet langer dan de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.

Deze Patiënt Informatie Folder (P.I.F.) geeft (beperkte) algemene informatie over het product. De afleverende apotheek kan niet juridisch aansprakelijk gesteld worden voor de informatie van dit document.

Ceban, december 2016